

Impfkalender

Impfung	Säuglinge				Kleinkinder		Kinder		Jugendliche			Erwachsene	
	Alter in Wochen	Alter in Monaten			11-14	15-23	Alter in Jahren						
	6	2	3	4			5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G ¹	G		G ²									
Tetanus, Diphtherie		G	+	G	G		A			A	— Auffrischung alle 10 Jahre →		
Keuchhusten		G	+	G	G		A			A			A ³
Haemophilus influenzae B		G	+	G	G								
Kinderlähmung		G	+	G	G					A			
Hepatitis B		G	+	G	G								
Pneumokokken		G	+	G	G								S
Meningokokken C						G ⁴							
Masern					G	G							S ⁵
Mumps, Röteln					G	G							
Windpocken					G	G							
Humane Papillomaviren										G G ⁶			
Gürtelrose													G G ⁷
Influenza													S ⁸

G Grundimmunisierung

A Auffrischungsimpfung

S Standardimpfung

1 erste Impfung ab dem Alter von sechs Wochen; je nach Impfstoff zwei bis drei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen

2 kann bei bestimmten Impfstoffen entfallen

3 einmalig als Kombinationsimpfung mit dem Impfstoff gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) und Diphtherie empfohlen sowie für Schwangere gegen Ende der Schwangerschaft

4 ab 12 Monaten

5 einmalige Impfung für alle ab 18 Jahren, die nach 1970 geboren sind und die in ihrer Kindheit nur einmal, keinmal oder nicht sicher gegen Masern geimpft wurden

6 zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten

7 zwei Impfungen mit einem Totimpfstoff im Abstand von mindestens zwei bis maximal sechs Monaten

8 jährlich

+ nur für Frühgeborene

Quelle: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Stand: Juni 2020