

Impfkalender

Impfung	Säuglinge				Kleinkinder		Kinder		Jugendliche			Erwachsene	
	Alter in Wochen	Alter in Monaten			11-14	15-23	5-6	7-8	Alter in Jahren				
		6	2	3					4	9-14	15-16	17	ab 18
Rotaviren	G ¹	G		G ²									
Tetanus, Diphtherie		G	+	G	G		A		A	— Auffrischung alle 10 Jahre →			
Keuchhusten		G	+	G	G		A		A			A ³	
Haemophilus influenzae B		G	+	G	G								
Kinderlähmung		G	+	G	G				A				
Hepatitis B		G	+	G	G								
Pneumokokken		G	+	G	G								S
Meningokokken C						G ⁴							
Masern					G	G							S ⁵
Mumps, Röteln					G	G							
Windpocken					G	G							
Humane Papillomaviren									G G ⁶				
Gürtelrose													G G ⁷
Influenza													S ⁸



Grundimmunisierung



Auffrischungsimpfung



Standardimpfung

¹ erste Impfung ab dem Alter von sechs Wochen; je nach Impfstoff zwei bis drei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen

² kann bei bestimmten Impfstoffen entfallen

³ einmalig als Kombinationsimpfung mit dem Impfstoff gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) und Diphtherie empfohlen sowie für Schwangere gegen Ende der Schwangerschaft

⁴ ab 12 Monaten

⁵ einmalige Impfung für alle ab 18 Jahren, die nach 1970 geboren sind und die in ihrer Kindheit nur einmal, keinmal oder nicht sicher gegen Masern geimpft wurden

⁶ zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten

⁷ zwei Impfungen mit einem Totimpfstoff im Abstand von mindestens zwei bis maximal sechs Monaten

⁸ jährlich

+ nur für Frühgeborene

Quelle: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Stand: Juni 2020

