

# Impfkalender

Impfung	Säuglinge				Kleinkinder		Kinder		Jugendliche			Erwachsene	
	Alter in Wochen	Alter in Monaten			11-14	15-23	5-6	7-8	Alter in Jahren				
		6	2	3					4	9-14	15-16	17	ab 18
Rotaviren	<b>G</b> <sup>1</sup>	<b>G</b>		<b>G</b> <sup>2</sup>									
Tetanus, Diphtherie		<b>G</b>	+	<b>G</b>	<b>G</b>		<b>A</b>		<b>A</b>	— Auffrischung alle 10 Jahre →			
Keuchhusten		<b>G</b>	+	<b>G</b>	<b>G</b>		<b>A</b>		<b>A</b>			<b>A</b> <sup>3</sup>	
Haemophilus influenzae B		<b>G</b>	+	<b>G</b>	<b>G</b>								
Kinderlähmung		<b>G</b>	+	<b>G</b>	<b>G</b>				<b>A</b>				
Hepatitis B		<b>G</b>	+	<b>G</b>	<b>G</b>								
Pneumokokken		<b>G</b>	+	<b>G</b>	<b>G</b>								<b>S</b>
Meningokokken C						<b>G</b> <sup>4</sup>							
Masern					<b>G</b>	<b>G</b>							<b>S</b> <sup>5</sup>
Mumps, Röteln					<b>G</b>	<b>G</b>							
Windpocken					<b>G</b>	<b>G</b>							
Humane Papillomaviren									<b>G</b> <b>G</b> <sup>6</sup>				
Gürtelrose													<b>G</b> <b>G</b> <sup>7</sup>
Influenza													<b>S</b> <sup>8</sup>
Covid-19												<b>G</b> <b>G</b> <b>A</b> <sup>9</sup>	<b>S</b> <sup>10</sup>

- G** Grundimmunisierung
- A** Auffrischungsimpfung
- S** Standardimpfung

- 1 erste Impfung ab dem Alter von sechs Wochen; je nach Impfstoff zwei bis drei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen
  - 2 kann bei bestimmten Impfstoffen entfallen
  - 3 einmalig als Kombinationsimpfung mit dem Impfstoff gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) und Diphtherie empfohlen sowie für Schwangere gegen Ende der Schwangerschaft
  - 4 ab 12 Monaten
  - 5 einmalige Impfung für alle ab 18 Jahren, die nach 1970 geboren sind und die in ihrer Kindheit nur einmal, keinmal oder nicht sicher gegen Masern geimpft wurden
  - 6 zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten
  - 7 zwei Impfungen mit einem Totimpfstoff im Abstand von mindestens zwei bis maximal sechs Monaten
  - 8 jährlich
  - 9 zwei Impfungen, Abstand je nach Impfstoff mindestens drei Wochen, Auffrischung frühestens nach sechs Monaten
  - 10 jährlich, aber immer mindestens ein Jahr nach letzter Impfung oder Erkrankung, bevorzugt im Herbst
- + nur für Frühgeborene

Quelle: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Stand: September 2023

