

Impfkalender

Impfung	Säuglinge			Kleinkinder					Kinder		Jugendliche			Erwachsene		
	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren									
	6	2	3	4	11	12	13-14	15	16-23	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G ¹		G	(G) ²												
Tetanus, Diphtherie		G	+	G	G					A		A	— Auffrischung alle 10 Jahre →			
Keuchhusten		G	+	G	G					A		A			A ³	
Haemophilus influenzae B		G	+	G	G											
Kinderlähmung		G	+	G	G							A				
Hepatitis B		G	+	G	G											
Pneumokokken		G	+	G	G											S
Meningokokken B		G		G		G										
Meningokokken C						G										
Masern					G			G								S ⁴
Mumps, Röteln					G			G								
Windpocken					G			G								
Humane Papillomaviren												G G ⁵				
Gürtelrose																G G ⁶
Influenza																S ⁷
Covid-19														⁸	G1 G2 G3	S ⁷

- G** Grundimmunisierung
- A** Auffrischungsimpfung
- S** Standardimpfung

- 1 erste Impfung ab dem Alter von sechs Wochen; je nach Impfstoff zwei bis drei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen
- 2 kann bei bestimmten Impfstoffen entfallen
- 3 einmalig als Kombinationsimpfung mit dem Impfstoff gegen Tetanus (Wundstarrkrampf) und Diphtherie empfohlen sowie für Schwangere gegen Ende der Schwangerschaft
- 4 einmalige Impfung für alle ab 18 Jahren, die nach 1970 geboren sind und die in ihrer Kindheit nur einmal, keinmal oder nicht sicher gegen Masern geimpft wurden
- 5 zwei Impfungen im Abstand von mindestens fünf Monaten
- 6 zwei Impfungen mit einem Totimpfstoff im Abstand von mindestens zwei bis maximal sechs Monaten
- 7 jährlich im Herbst. Impfung Covid-19 nicht nötig, wenn man im letzten Jahr daran erkrankt war
- 8 Abstand zwischen G1 und G2 mindestens vier bis 12 Wochen, zwischen G2 und G3 mindestens sechs Monate

Quelle: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, Stand: Januar 2024

APOTHEKEN
Umschau